

Parodontal[®]

Mundsalbe

Lidocain 1,0 g/100 g, Auszug aus Salbeiblättern und Kamillenblüten je 12,0 g/100 g, Gel zur Anwendung in der Mundhöhle

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Zahnarztes oder Apothekers an.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 5–7 Tagen keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Parodontal Mundsalbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Parodontal Mundsalbe beachten?
3. Wie ist Parodontal Mundsalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Parodontal Mundsalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist PARODONTAL MUNDALBE und wofür wird sie angewendet?

Parodontal Mundsalbe ist ein Gel zur Behandlung von Erkrankungen der Mundhöhle. Parodontal Mundsalbe wird angewendet zur zeitweiligen unterstützenden Behandlung von Entzündungen und Wunden der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches.



2. Was sollten Sie vor der Anwendung von PARODONTAL MUNDALBE beachten?

Parodontal Mundsalbe darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile von Parodontal Mundsalbe sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Parodontal Mundsalbe ist erforderlich – bei Patienten mit schweren Störungen des Reizbildungs- und Reizleitungssystems am Herzen, akuter dekompensierter Herzinsuffizienz und schweren Nieren- oder Lebererkrankungen.

Anwendung von Parodontal Mundsalbe zusammen mit anderen Arzneimitteln
Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Anwendung von Parodontal Mundsalbe während der Schwangerschaft sollte nur erfolgen, wenn dies unbedingt notwendig ist. Kontrollierte Untersuchungen an Schwangeren liegen nicht vor. Lidocain geht in geringer Menge in die Muttermilch über. Eine Gefahr für den Säugling erscheint bei therapeutischen Dosen unwahrscheinlich.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Parodontal Mundsalbe enthält Propylenglycol. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist Parodontal Mundsalbe anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Zahnarzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Zahnarzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

In der zahnärztlichen Praxis wird das Wundgebiet versorgt und eine entsprechend große Menge Gel aufgetragen.

In der häuslichen Anwendung wird, wenn vom Zahnarzt nicht anders verordnet, dreibis viermal täglich eine erbsengroße Menge Gel mit der gereinigten Fingerkuppe auf die schmerzende oder entzündete Stelle aufgetragen bzw. in die Zahnfleischtaschen eingebracht und gründlich einmassiert. Bitte spülen Sie jeweils vorher den Mund mit Wasser aus.

Wenden Sie die Parodontal Mundsalbe bis zur Besserung der Entzündung bzw. bis zur Abheilung der Wunde oder entsprechend der Empfehlung ihres Zahnarztes oder Arztes an.

Sollte sich das Krankheitsbild allerdings verschlimmern oder nach 5–7 Tagen noch keine Besserung eingetreten sein, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

Wenn Sie eine größere Menge Parodontal Mundsalbe angewendet oder versehentlich oral aufgenommen haben, ist mit toxischen Erscheinungen nicht zu rechnen.



4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Parodontal Mundsalbe auftreten. In diesem Falle sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt.

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de** anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist PARODONTAL MUNDALBE aufzubewahren?

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate

6. Weitere Informationen

Was Parodontal Mundsalbe enthält:

100 g Gel enthalten:

Wirkstoffe:

Lidocain	1,00 g
Auszug aus Salbeiblättern (1:1,95–2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3% (V/V)	12,00 g
Auszug aus Kamillenblüten (1:1,9–2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3% (V/V)	12,00 g



Die sonstigen Bestandteile sind:

Minzöl; Propylenglycol; Kaliumcarbonat; Kieselsol 1430; Hyetellose; Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Trinatriumsalz; gereinigtes Wasser.

Wie Parodontal Mundsalbe aussieht und Inhalt der Packung:

Parodontal Mundsalbe ist ein dunkelgrünes Gel und in Tuben zu 6 g und 20 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b
06406 Bernburg

Telefon: 03471 8600

Telefax: 03471 860408

Die Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2017

Liebe Patientin, lieber Patient,

Parodontal Mundsalbe ist ein Mundgel zur Behandlung von Entzündungen und Wunden der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches.

Solche Erkrankungen können sowohl bei Erwachsenen als auch bei Säuglingen und Kindern vorkommen. Die Erscheinungsbilder sowie die Ursachen können vielfältig sein. Weil Entzündungen im Mundbereich sehr schmerzhaft sein können, leiden Säuglinge, Kleinkinder, Zahnsparren- und Prothesenträger besonders darunter. Bei ihnen kann es zu einer Entzündung der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches in Verbindung mit weißlichen Bläschen oder offenen Stellen (Aphthen) kommen. Unabhängig von der Ursache sind Schmerzen im Mund äußerst unangenehm. Parodontal Mundsalbe wirkt den Entzündungsbeschwerden auf mehreren Ebenen entgegen:

- Parodontal Mundsalbe wirkt schmerzstillend durch Lidocain. Dieser Wirkstoff unterdrückt die Entstehung und Weiterleitung des Schmerzreizes.
- Pflanzliche Inhaltsstoffe aus Kamille und Salbei wirken der Entzündung entgegen und fördern die Wundheilung.
- Kamille und Salbei haben zusätzlich eine leicht desinfizierende Wirkung und verringern dadurch den Befall durch schädliche Keime.
- Parodontal Mundsalbe enthält keine Konservierungsmittel und keinen Zucker oder Zuckersatzstoffe.

Da das Gel direkt auf die betroffenen Stellen im Mund aufgetragen wird, kann es schnell und zuverlässig wirken.

Unsere besondere Empfehlung für die ganze Familie: Parodontal Mundsalbe sichert bei Zahnungsbeschwerden, bei Druckstellen und Entzündungen durch Zahnsparren und Zahnprothesen eine lang anhaltende Schmerzbefreiung. Tragen Sie zur Behandlung von Prothesendruckstellen die Mundsalbe auf die gereinigte Prothese auf.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen gute Besserung!

 **serumwerk**
bernburg

04-05-9757/30

