

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Haenal® akut

Wirkstoff: Quinisocainhydrochlorid

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil

1 g Creme enthält 5,0 mg Quinisocainhydrochlorid

Sonstige Bestandteile

Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218) und Propyl-4-hydroxybenzoat-Natrium (E 217) zur Konservierung, Glycerol 85 %, Polysorbat 60, 1-Hexadecanol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Packungen mit 30 g (N1) und 50 g (N2) Creme.

Dermatikum

Pharmazeutischer Unternehmer

Strathmann GmbH & Co. KG,

Postfach 610425, 22424 Hamburg

Tel: 040/55 90 5-0; Fax: 040/55 90 5-100

Hersteller

Biokirch GmbH, Bei den Kämpen 11, 21220 Seevetal

Anwendungsgebiete

Linderung von Brennen und Jucken im Afterbereich

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Haenal® akut nicht anwenden?

Sie dürfen Haenal akut nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Quinisocainhydrochlorid, Parabenen (E 217 und 218) oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Bei stark blutenden Hämorrhoidalknoten dürfen Sie Haenal akut Creme ebenfalls nicht anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Dürfen Sie Haenal® akut in Schwangerschaft und Stillzeit anwenden? Es liegen keine Daten für die Verwendung von Haenal akut in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Haenal akut sollte daher in Schwangerschaft und Stillzeit nur angewendet werden, wenn der zu erwartende Nutzen einer Behandlung mit Haenal akut größer als die Risiken ist. Fragen Sie hierzu Ihren behandelnden Arzt oder den Apotheker.

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Die Sicherheit von Kondomen kann beeinträchtigt werden, siehe auch unter Wechselwirkungen.

Haenal akut soll nicht großflächig und nicht in Augennähe aufgetragen werden.

Warnhinweis zu bestimmten Bestandteilen von Haenal® akut

Haenal akut enthält Parabene (E 217 und 218) als Konservierungsmittel. Diese Stoffe können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Haenal® akut und was müssen Sie beachten, wenn Sie zusätzlich andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden? Bei gleichzeitiger Anwendung von Haenal akut und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Haenal akut nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Haenal akut sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel von Haenal® akut und wie oft sollten Sie Haenal akut anwenden? Tragen Sie je nach Beschwerdebild 1- bis 2-mal täglich einen ca. 1 cm langen Cremestrang auf.

Wie und wann sollten Sie Haenal® akut anwenden? Vor der Anwendung sollte der After mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch sorgfältig gereinigt werden. Vermeiden Sie bitte zusätzliche Reizungen und tupfen Sie, anstatt zu reiben.

Wie lange sollten Sie Haenal® akut anwenden? Wenden Sie Haenal akut nicht länger als 1 Woche ohne Unterbrechung an. Sollten die Beschwerden anhalten, suchen Sie bitte unbedingt einen Arzt für Enddarmkrankungen (Proktologie) auf.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Haenal® akut in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)? Überdosierungen sind nicht bekannt.

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann Haenal akut Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen wird folgende Häufigkeitsangabe zu Grunde gelegt:

Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Haenal® akut auftreten? Sehr selten können Reizungen oder allergische Hauterscheinungen auftreten. Parabene (E 217 und 218) können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt und unterlassen jede weitere Anwendung.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Haenal akut sollte nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden. Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt.

Nach Anbruch nicht länger als 3 Monate verwenden.

Wie ist Haenal® akut aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information: Juli 2006

01/086-00111

