

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation aufmerksam durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *NAC 600 akut - 1A-Pharma* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4-5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist *NAC 600 akut - 1A-Pharma*?
2. Wofür wird *NAC 600 akut - 1A-Pharma* angewendet?
3. Was müssen Sie vor der Einnahme von *NAC 600 akut - 1A-Pharma* beachten?
4. Wie ist *NAC 600 akut - 1A-Pharma* einzunehmen?
5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
6. Wie ist *NAC 600 akut - 1A-Pharma* aufzubewahren?



NAC 600 akut - 1A-Pharma®

Wirkstoff: Acetylcystein 600 mg pro Brausetablette

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Brausetablette enthält 600 mg Acetylcystein.

Sonstige Bestandteile:

Ascorbinsäure, wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Lactose, Macrogol, Natriumcarbonat, Natriumcyclamat, Natriumhydrogencarbonat, Saccharin-Natrium, Brombeearoma, Waldbeearoma

Hinweis für Diabetiker: 1 Brausetablette *NAC 600 akut - 1A-Pharma* enthält 0,02 BE.

Darreichungsform und Inhalt

NAC 600 akut - 1A-Pharma ist in Packungen mit 6 (N1), 10 (N1) und 20 (N1) Brausetabletten erhältlich.

1 A Pharma GmbH

Keltnering 1 + 3

82041 Oberhaching

Telefon: 089/6138825-0

Hersteller

SALUTAS Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Was ist *NAC 600 akut - 1A-Pharma*?

NAC 600 akut - 1A-Pharma ist ein Arzneimittel zur Verflüssigung zähen Schleims in den Atemwegen.

Wofür wird *NAC 600 akut - 1A-Pharma* angewendet?

NAC 600 akut - 1A-Pharma wird zur Schleimlösung und zum erleichterten Abhusten bei Atemwegserkrankungen mit zähem Schleim angewendet.

Was müssen Sie vor der Einnahme von *NAC 600 akut - 1A-Pharma* beachten?

Sie dürfen *NAC 600 akut - 1A-Pharma* nicht einnehmen, wenn Sie überempfindlich gegenüber Acetylcystein oder einem der sonstigen Bestandteile von *NAC 600 akut - 1A-Pharma* sind.

Schwangerschaft und Stillzeit

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *NAC 600 akut - 1A-Pharma* ist in Schwangerschaft und Stillzeit erforderlich, da hierfür keine ausreichenden Erfahrungen mit der Anwendung von *NAC 600 akut - 1A-Pharma* vorliegen.

Sie dürfen *NAC 600 akut - 1A-Pharma* in der Schwangerschaft und Stillzeit nur anwenden, wenn Ihr Arzt entschieden hat, dass die Anwendung absolut notwendig ist.

Kinder

Geben Sie Kindern unter 2 Jahren *NAC 600 akut - 1A-Pharma* nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

NAC 600 akut - 1A-Pharma ist aufgrund des hohen Wirkstoffgehaltes für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Hierfür stehen Arzneimittel mit geringerem Wirkstoffgehalt zur Verfügung

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von *NAC 600 akut - 1A-Pharma*

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie *NAC 600 akut - 1A-Pharma* daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Eine Brausetablette enthält 13,7 mmol (314,8 mg) Natrium. Wenn Sie eine kochsalzarme Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Medikamente einnehmen bzw. bis vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hustenstillende Mittel (Antitussiva)

Bei kombinierter Anwendung von *NAC 600 akut - 1A-Pharma* und hustenstillenden Mitteln kann der verflüssigte Schleim eventuell nicht mehr ausreichend abgehustet werden. Fragen Sie daher vor einer kombinierten Anwendung unbedingt Ihren Arzt oder Apotheker

Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tetracyclinhydrochlorid (Antibiotikum)

Eine Wirkungsabschwächung von Tetracyclinhydrochlorid bei zeitgleicher Einnahme mit *NAC 600 akut - 1A-Pharma* ist möglich. Die Einnahme beider Arzneimittel muss daher in einem mindestens 2stündigen Abstand zeitversetzt erfolgen.

Arzneimittel mit dem Wirkstoff Glyceroltrinitrat (Herzmittel)

Die gleichzeitige Gabe von *NAC 600 akut - 1A-Pharma* kann zu einer Verstärkung des gefäßerweiternden und blutverdünnenden Effekts von Medikamenten mit dem Wirkstoff Glyceroltrinitrat führen.

Wie ist NAC 600 akut - 1A-Pharma einzunehmen?

Wenden Sie NAC 600 akut - 1A-Pharma immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Nehmen Sie NAC 600 akut - 1A-Pharma nach den Mahlzeiten ein.

Lösen Sie bitte die NAC 600 akut - 1A-Pharma-Brause-Tablette in einem Glas Trinkwasser auf und trinken Sie den Inhalt des Glases vollständig aus.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, gilt folgende Dosierung:

Alter	Tagesgesamt-dosis (Brausetabletten)
Jugendliche über 14 Jahre und Erwachsene	2 mal täglich je 1, oder 1 mal täglich je 1

Sollten sich die Symptome verschlimmern oder nach 4 bis 5 Tagen Behandlung nicht bessern, sollten Sie Ihren Arzt befragen.

Hinweis:

Die schleimlösende Wirkung von NAC 600 akut - 1A-Pharma wird durch Flüssigkeitszufuhr unterstützt.

Wenn Sie eine größere Menge von NAC 600 akut - 1A-Pharma eingenommen haben, als Sie sollten:

Bei Überdosierung können Reizerscheinungen im Magen-Darm-Bereich auftreten.

Diese können sich als Sodbrennen, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall äußern.

Schwerwiegende Nebenwirkungen oder Vergiftungserscheinungen sind jedoch auch bei extremer Überdosierung bisher nicht beobachtet worden.

Bei Verdacht auf eine Überdosierung mit NAC 600 akut - 1A-Pharma benachrichtigen Sie bitte dennoch Ihren Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von NAC 600 akut - 1A-Pharma vergessen haben:

Wenn Sie einmal vergessen haben, NAC 600 akut - 1A-Pharma zu nehmen oder zuwenig genommen haben, holen Sie die vergessene Einnahme nicht nach, sondern setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Dosierung wie beschrieben fort.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann NAC 600 akut - 1A-Pharma Nebenwirkungen haben.

Die Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Acetylcystein, auch solche unter höherer Dosierung oder Langzeittherapie.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten: weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: 1 Fall oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von NAC 600 akut - 1A-Pharma auftreten?

Gelegentlich wurde über das Auftreten von Mundschleimhautentzündungen, Kopfschmerzen und Ohrgeräuschen berichtet.

Selten können auftreten: Beschwerden im Magen-Darm-Bereich (z. B. Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall).

Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Quaddelbildung, Hautausschlag, Atemnot (überwiegend bei Asthmatikern), Herzschlagsbeschleunigung und Blutdrucksenkung) wurden sehr selten berichtet. Die sehr selten berichteten Bronchospasmen (Krämpfe im Bereich der Atemwegorgane) betrafen überwiegend Patienten mit hyperreaktivem Bronchialsystem bei Asthma bronchiale (eine übersteigerte Reaktion in den Atemorganen bei einer besonderen Atemwegserkrankung).

Selten wurde über das Auftreten von Blutungen im Zusammenhang mit der Gabe von Acetylcystein berichtet, zum Teil im Rahmen von Überempfindlichkeitsreaktionen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf NAC 600 akut - 1A-Pharma nicht nochmals eingenommen werden. Informieren Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

Wie ist NAC 600 akut - 1A-Pharma aufzubewahren?

Das Verfalldatum dieser Packung finden Sie auf der Faltschachtel und dem Röhrchen. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!
Brausetabletten trocken lagern und vor Licht schützen!
Röhrchen nach Tablettenentnahme wieder fest verschließen.

Nicht über 30°C lagern!

Stand der Information: Februar 2004

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf!

1 A Pharma GmbH wünscht gute Besserung!