



Liebe Anwenderin, lieber Anwender!  
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam,  
weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei  
der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.  
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



## Gebrauchsinformation

# Sikapur<sup>®</sup>

Silicium-Gel

Wirkstoff: Kieselsäure-Gel mit gefällttem, disperskolloidalem Siliciumdioxid

## Zusammensetzung

100 ml Gel enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 ml Kieselsäure-Gel mit 5,4 g gefällttem disperskolloidalem Kieselsäure-  
anhydrid (Siliciumdioxid)

Sonstiger Bestandteil: Chlorhexidinbis(D-Gluconat)

## Darreichungsform und Inhalt

50 ml Gel

Stoff- oder Indikationsgruppe: Traditionelles Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer:

Medopharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, Schloßstr.11, D-79238 Ehrenkirchen

Hersteller: Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11-17, D-79238 Ehrenkirchen

## Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

## Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Sikapur<sup>®</sup>Silicium-Gel nicht anwenden?*

Für Sikapur<sup>®</sup>Silicium-Gel sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## Wechselwirkungen

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Sikapur<sup>®</sup>Silicium-Gel?*

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.





## **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Sikapur® Silicium-Gel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Sikapur® Silicium-Gel sonst nicht richtig wirken kann!

### *Wie sollten Sie Sikapur® Silicium-Gel anwenden?*

Sikapur® Silicium-Gel 2-3 mal täglich auf die gereizten Hautbezirke auftragen und eventuell mit einem feuchten Gazestreifen überdecken.

## **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Sikapur® Silicium-Gel auftreten?*

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Das Präparat ist zunächst abzusetzen.

## **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und auf dem Behältnis aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

### *Wie ist Sikapur® Silicium-Gel aufzubewahren?*

Nicht über 25° C aufbewahren. Sikapur® Silicium-Gel vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen bitte im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Vor Frost schützen.

Stand der Information: September 2006



MEDOPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG • Schloßstr. 11 • 79238 Ehrenkirchen

