

Verpflichtende Informationen über Lebensmittel
 - gemäß Art. 9, Abs. 1 Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)
 Stand: 01/2019

Saltadol® Glucose-Elektrolyt-Mischung
 Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
 Pulvermischung

Zum Diätmanagement von Flüssigkeitsmangel (Dehydration) bei Durchfallerkrankungen.

Geeignet für Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder und Erwachsene.

Zutaten

Traubenzucker, Kochsalz, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Süßungsmittel Acesulfam K und Aspartam. Der Mineralstoffgehalt wurde der erforderlichen Osmolarität angepasst. Enthält pro Beutel Salz: 0,52 g (davon Natrium 320 mg).

Enthält eine Phenylalaninquelle. Mit Zucker und Süßungsmitteln.

Nährwertdeklaration

	pro 100 g	pro Einzeldosis (200 ml)
Energie	1111 kJ / 261,5 kcal	45,9 kJ / 10,8 kcal
Fett	0 g	0 g
- gesättigte Fettsäuren	0 g	0 g
Kohlenhydrate	65,38 g (5,3 BE)	2,7 g (0,22 BE)
- Zucker	65,38 g (5,3 BE)	2,7 g (0,22 BE)
Eiweiß	0 g	0 g
Salz	12,6 g	0,52 g
	pro 100 g	pro Einzeldosis (200 ml)
Natrium	7748 mg	320 mg
Kalium	3874 mg	160 mg
Chlorid	11138 mg	460 mg
	pro 100 g	pro Einzeldosis (200 ml)
Lactose	0 g	0 g
Gluten	0 g	0 g

Elektrolytgehalt der fertigen Lösung

Na⁺ 75 mmol/l
 K⁺ 20 mmol/l
 Cl⁻ 65 mmol/l
 Citrat 10 mmol/l
 D-Glucose 75 mmol/l
 Osmolarität nach Zubereitung: ca. 245 mmol/l

Packungsgrößen/Inhalt (netto)

Packungen zu 6 Beuteln = 24,78 g (PZN: 11661762) und
 Packungen zu 12 Beuteln = 49,56 g (PZN: 11661779)

Verpflichtende Informationen über Lebensmittel
- gemäß Art. 9, Abs. 1 Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)
Stand: 01/2019

Anweisungen für Aufbewahrung/ Anweisungen für die Verwendung

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Kühl und trocken lagern.

Ein Beutel enthält 4,13 g Pulvermischung.

Der Inhalt eines Beutels wird in 200 ml abgekochtem, abgekühltem Wasser oder Tee aufgelöst und warm oder kalt getrunken. Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sie dauert bei Säuglingen und Kleinkindern in der Regel 6 – 12 Stunden, maximal 24 Stunden.

Säuglinge:

Bei Weglassen jeder Nahrung über 24 Stunden verteilt eine Trinkmenge von 120 – 150 ml pro kg/Körpergewicht. Pro Stunde sollte die Trinkmenge ca. 10 ml/kg Körpergewicht betragen. Die Tagesmenge sollte bei Säuglingen auf 6 Beutel begrenzt werden.

Kleinkinder, Schulkinder und Erwachsene:

Trinken, je nach Bedarf, mehrmals täglich den Inhalt des Beutels, gelöst in 200 ml Flüssigkeit. Erwachsene können bei starkem Durchfall bis zu 4 Liter Saltadol® über den Tag verteilt trinken. Dies entspricht einer Menge von 20 Beuteln

Wichtige Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen

Geeignet für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. Nicht zur Selbstbehandlung schwerer Durchfälle verwenden, die länger als 3 Tage andauern. Patienten mit Herzschwäche und erhöhtem Blutdruck sowie Diabetiker bitte vorher den behandelnden Arzt befragen. Bei gleichzeitiger Therapie mit Herzwirksamen Glucosiden bitte sorgfältig Kaliumgehalt (des Patienten) überwachen. Nicht anwenden bei Ausscheidungsstörungen der Nieren, metabolischer Alkalose, unstillbarem Erbrechen, Kohlenhydrataufnahmestörungen, Bewusstseinstörungen und Schock sowie bei vorliegender Phenylketonurie. Nicht anwenden bei akutem Flüssigkeitsmangel infolge von Verschlusserkrankungen im Verdauungstrakt. Saltadol® nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet. Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet!

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8 - 10
13435 Berlin
Tel: 030 71094-4200
Fax: 030 71094-4250

Hergestellt in Deutschland.
Nur in Apotheken erhältlich.

Verpflichtende Informationen über Lebensmittel
- gemäß Art. 9, Abs. 1 Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)
Stand: 01/2019
