Gebrauchsinformation:
Information für den Anwender

neo-angin®
HALSSPRAY

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss neo-angin® Halsspray jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3-4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist neo-angin® Halsspray und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halsspray beachten?
3. Wie ist neo-angin® Halsspray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist neo-angin® Halsspray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

neo-angin® Halsspray
Wirkstoffe in 10 ml Spray: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 145,8 mg, Amylmetacresol 29,2 mg, Levomenthol 8,7 mg

1. Was ist neo-angin® Halsspray und wofür wird es angewendet?

neo-angin® Halsspray ist ein Hals- und Rachentherapeutikum.
Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halsspray beachten?

neo-angin® Halsspray darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin® Halsspray sind,
- von Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren,
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von neo-angin® Halsspray kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Bei Anwendung von neo-angin® Halsspray mit anderen Arzneimitteln:
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin® Halsspray in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin® Halsspray darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von neo-angin® Halsspray
Dieses Arzneimittel enthält 23,8 Vol.-% Ethanol. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist neo-angin® Halsspray anzuwenden?

Wenden Sie neo-angin® Halsspray immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Schutzkappe abziehen und, soweit nicht anders verordnet, durch Druck auf den Sprühkopf zwei Stöße bei angehaltenem Atem in den Mund sprühen. Die Behandlung kann bis zu 6-mal täglich wiederholt werden. Wenden Sie neo-angin® Halsspray ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 – 4 Tage an.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann neo-angin® Halsspray Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:
Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist neo-angin® Halsspray aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und dem Etikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
Nicht über 25°C lagern.

6. Weitere Informationen

Was neo-angin® Halsspray enthält:

Die Wirkstoffe sind: 10 ml Spray enthalten:	2,4-Dichlorbenzylalkohol	145,8 mg
	Amylmetacresol	29,2 mg
	Levomenthol	8,7 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Ethanol 96%, Propylenglycol, Kirsch-Aroma, Wintergrünöl, Aroma zur Maskierung.

Inhalt der Packung:
neo-angin® Halsspray ist im Behältnis mit 30 ml erhältlich.

neo-angin®
HALSSPRAY

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
DIVAPHARMA GmbH
Motzener Straße 41
12277 Berlin
Tel. 030 / 72007– 266
Fax 030 / 72007– 326

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2010.

Klosterfrau Kundenberatung:
Tel.: 0800 / 1652-100
Fax: 0800 / 1652-700
e-mail: dialog@klosterfrau-service.de

32 008 052 03P0111 256