

# Bepanthen®



## Bepanthen® LÖSUNG

Mit 5% Dexpanthenol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bepanthen® LÖSUNG jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach **1 Woche** keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bepanthen® LÖSUNG und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bepanthen® LÖSUNG beachten?
3. Wie ist Bepanthen® LÖSUNG anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bepanthen® LÖSUNG aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST BEPANTHEN® LÖSUNG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Bepanthen® LÖSUNG ist ein Mittel zur Unterstützung der Wundheilung.

**Bepanthen® LÖSUNG wird angewendet bei:**

Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Hautschädigungen sowie der Mundschleimhaut.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON BEPANTHEN® LÖSUNG BEACHTEN?

**Bepanthen® LÖSUNG darf nicht angewendet werden**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Dexpanthenol, Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat) oder einem der sonstigen Bestandteile von Bepanthen® LÖSUNG sind.

**Bei Anwendung von Bepanthen® LÖSUNG mit anderen Arzneimitteln**

sind bislang keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Während der Schwangerschaft und Stillzeit besteht für Bepanthen® LÖSUNG keine Anwendungsbeschränkung.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bepanthen® LÖSUNG**

Natriumbenzoat kann leichte Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten hervorrufen.

Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat) können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

### 3. WIE IST BEPANTHEN® LÖSUNG ANZUWENDEN?

Wenden Sie Bepanthen® LÖSUNG immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Tragen Sie Bepanthen® LÖSUNG ein- bis mehrmals täglich unverdünn auf die betroffenen Stellen auf oder wenden Sie sie in Form von Spülungen oder Umschlägen an.

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung. Wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Bepanthen® LÖSUNG Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<i>Sehr häufig:</i>	mehr als 1 Behandler von 10
<i>Häufig:</i>	1 bis 10 Behandelte von 100
<i>Gelegentlich:</i>	1 bis 10 Behandelte von 1.000
<i>Selten:</i>	1 bis 10 Behandelte von 10.000
<i>Sehr selten:</i>	weniger als 1 Behandler von 10.000
<i>Nicht bekannt:</i>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Bepanthen® LÖSUNG nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

In seltenen Fällen sind Unverträglichkeitsreaktionen (z. B. allergische Hautreaktionen) beobachtet worden.

#### Andere mögliche Nebenwirkungen

Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat) können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

### 5. WIE IST BEPANTHEN® LÖSUNG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

Das Verfallsdatum dieser Packung steht auf der Faltschachtel sowie auf dem Etikett der Flasche. Nach diesem Datum sollten Sie das Arzneimittel nicht mehr verwenden.

Bepanthen® LÖSUNG sollte nach Anbruch nicht länger als 30 Tage angewendet werden.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### Was enthält Bepanthen® LÖSUNG:

**Der Wirkstoff ist:** Dexpanthenol (1 ml Lösung enthält 50,0 mg Dexpanthenol)

**Die sonstigen Bestandteile sind:** Natriumbenzoat; Methyl(4-hydroxybenzoat); Propyl(4-hydroxybenzoat); rac-(3R)-3-Hydroxy-4,4-dimethylloxolan-2-on; Wasser für Injektionszwecke.

#### Wie sieht Bepanthen® LÖSUNG aus und Inhalt der Packung:

Bepanthen® LÖSUNG ist in einer Glasflasche zu 50 ml erhältlich.

#### Pharmazeutischer Unternehmer:

Bayer Vital GmbH, D-51368 Leverkusen

#### Hersteller:

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Straße 7, D-79639 Grenzach-Wyhlen

#### Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet am:

April 2008 /D 3a

Bayer

11870092