

## GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

### **Liebe Patientin,**

bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker.

# Agnucaston®

## Filmtabletten



Wirkstoff: Trockenextrakt aus Früchten des Mönchspfeffers

### **Zusammensetzung:**

1 Filmtablette enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 3,2 bis 4,8 mg Trockenextrakt aus Früchten des Mönchspfeffers (8,3-12,5:1), entsprechend 40 mg Droge (Auszugsmittel: 70 Vol.-% Ethanol).

### *Sonstige Bestandteile:*

*Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon), Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat, Talkum, Ammoniummethacrylat-Copolymer, Hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol, Farbstoffe: E 171, E 172 und E 132.*

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Originalpackungen mit 30 (N1), 60 (N2) und 90 (N3) Filmtabletten.

### **Pflanzliches Arzneimittel bei Regelbeschwerden.**

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

BIONORICA AG

Kerschensteinerstr. 11 - 15, 92318 Neumarkt

Telefon: 0 91 81 / 2 31-90 · Telefax: 0 91 81 / 2 31-2 65

Internet: [www.bionorica.de](http://www.bionorica.de) · E-Mail: [info@bionorica.de](mailto:info@bionorica.de)

### **Anwendungsgebiete:**

Regeltempoanomalien. Vor der monatlichen Regelblutung auftretende Beschwerden (prämenstruelle Beschwerden). Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie).

### Hinweis:

Bei Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten sowie bei Störungen der Regelblutung sollte zur diagnostischen Abklärung zunächst ein/e Arzt/Ärztin aufgesucht werden.

### **Gegenanzeigen:**

Gegenanzeigen sind bisher keine bekannt.

### *Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Agnucaston Filmtabletten sollten in der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Das Arzneimittel sollte nicht während der Stillzeit angewendet werden, da im Tierversuch eine Verminderung der Milchproduktion gesehen wurde.

# **BIONORICA®**

The phytoneering company

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Bei bestimmungsgemäßer Einnahme von Agnucaston Filmtabletten sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, sollten Sie vor der Einnahme von Agnucaston Filmtabletten Ihre/n Ärztin/Arzt befragen, da es Hinweise auf eine wechselseitige Wirkungsabschwächung bei gleichzeitiger Gabe von Dopaminrezeptor-Antagonisten gibt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr/e Arzt/Ärztin Agnucaston Filmtabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da das Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel von Agnucaston Filmtabletten und wie oft sollten Sie Agnucaston Filmtabletten anwenden?*

1 mal täglich 1 Filmtablette einnehmen.

*Wie und wann sollten Sie Agnucaston Filmtabletten anwenden?*

Agnucaston Filmtabletten sollten Sie über mehrere Monate ohne Unterbrechung - auch während der Regelblutung - einnehmen. Die Filmtabletten unzerkaut am besten mit einem Schluck Wasser einnehmen.

*Wie lange sollten Sie Agnucaston Filmtabletten anwenden?*

Auch nach Abklingen oder Besserung der Beschwerden sollte die Behandlung noch für einige Wochen fortgesetzt werden.

### **Nebenwirkungen:**

Gelegentlich können juckende Hautausschläge (Exantheme) mit Bläschenbildung auftreten. In Einzelfällen wurden vorübergehende psychomotorische Unruhe, Verwirrheitszustände und Halluzinationen beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrer/Ihrem Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und dem Behältnis (Durchdrückpackung) aufgedruckt. Agnucaston Filmtabletten sollen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

### **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

### **Stand der Information:**

Januar 2002

Diabetiker können Agnucaston Filmtabletten unbedenklich einnehmen, da eine Einzeldosis dieses Arzneimittels weniger als 0,03 anrechenbare Broteinheiten (BE) enthält.