

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

### Zinksalbe-CT



#### Zusammensetzung

• **arzneilich wirksame Bestandteile:**

100 g Salbe enthalten:

10 g Zinkoxid

7,5 g Lebertran

10 g Glycerol 85%

• **sonstige Bestandteile:**

Dünnflüssiges Paraffin, Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), Wollwachsalkohole, weißes Vaseline,

Butylhydroxytoluol (Ph.Eur.), Palmitoylascorbinsäure (Ph.Eur.), Citronensäure-Monohydrat,

Glycerolmonostearat, Propylenglycol, Vanillin, gereinigtes Wasser.

#### Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 35 g Salbe

Packung mit 100 g Salbe

#### Stoff- oder Indikationsgruppe

Mittel zur Unterstützung der Wundheilung

#### CT-Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42a

13407 Berlin

Telefon: 0 30/40 90 08-0

Telefax: 0 30/40 90 08-21

www.ct-arzneimittel.de

#### Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Wundheilung.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Hinweis:

Sollte sich im betroffenen Hautbereich keine Besserung einstellen, oder sollten die Beschwerden fortbestehen, ist der Arzt aufzusuchen.

#### Gegenanzeigen

**Wann dürfen Sie Zinksalbe-CT nicht anwenden?**

Sie dürfen Zinksalbe-CT nicht anwenden, wenn Sie bereits auf einen der Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich reagiert haben.

**Was müssen Sie in der Schwangerschaft beachten?**

Während der Schwangerschaft und Stillzeit besteht für Zinksalbe-CT keine Anwendungsbeschränkung.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Folgende Wechselwirkungen zwischen dem vorliegenden Arzneimittel und anderen Mitteln sind zu beachten:

Zinksalben schränken die Wirkungen anderer äußerlich anzuwendender Arzneimittel ein.

Vor der Anwendung solcher anderen äußerlich anzuwendenden Arzneimittel auf die gleiche Hautpartie muss die Zinksalbe vollständig entfernt werden.

### Hinweis:

Bei der Behandlung mit Zinksalbe-CT im Genital- oder Analbereich, kann es wegen der Hilfsstoffe Vaseline und Paraffin bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Zinksalbe-CT nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Zinksalbe-CT sonst nicht richtig wirken kann!

#### Wieviel und wie oft sollten Sie Zinksalbe-CT anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, wird Zinksalbe-CT ein bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen.

#### Wie lange sollten Sie Zinksalbe-CT anwenden?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

### Nebenwirkungen

#### Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Zinksalbe-CT auftreten?

Nach Auftragen von Zinksalben auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten.

Gelegentlich kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen.

#### Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Nebenwirkungen zum ersten Mal auftreten oder ihre Beschwerden sich verschlimmern sollten, wenden Sie Zinksalbe-CT nicht weiter an und suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist aufgedruckt.

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Anbruch der Tube:

Zinksalbe-CT ist nach Anbruch 12 Monate haltbar.

#### Wie müssen Sie Zinksalbe-CT aufbewahren?

Nicht über 25 °C lagern!

### Stand der Information

Dezember 2004

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

## CT-Arzneimittel wünscht Ihnen gute Besserung!

**CT**  
Arzneimittel