

## Gebrauchsinformation

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Posiformin® 2 % jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist Posiformin® 2 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Posiformin® 2 % beachten?
3. Wie ist Posiformin® 2 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Posiformin® 2 % aufzubewahren?

### Posiformin® 2 %

Wirkstoff: Bibrocathol

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Bibrocathol.

1 g Augensalbe enthält 20 mg Bibrocathol.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Weißes Vaseline, dickflüssiges Paraffin, Wollwachs

Posiformin® 2 % ist in Packungen mit 5 g Augensalbe erhältlich.

#### 1. Was ist Posiformin® 2 % und wofür wird es angewendet?

1.1 Posiformin® 2 % ist eine desinfizierende, zusammenziehende (adstringierend) und sekretionshemmende Augensalbe.

1.2 Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**URSAPHARM, Industriestr. 35, D-66129 Saarbrücken,**

**Tel.: 06805/92 92-0, Fax: 06805/92 92-88, Email: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de**

1.3 Posiformin® 2 % wird angewendet bei Reizzuständen des äußeren Auges, die nicht durch Erreger verursacht sind, chronischen (länger dauernden) Lidrandentzündungen, die nicht durch Erreger verursacht ist und nicht infizierten (nicht Erreger-behafteten), frischen Hornhautwunden.

Bei länger andauernden Beschwerden bzw. fehlender Besserung, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

#### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Posiformin® 2 % beachten?

2.1 Posiformin® 2 % dürfen Sie nicht anwenden

- wenn Sie auf einen der Bestandteile überempfindlich reagieren
- während Sie Kontaktlinsen tragen

2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Posiformin® 2 % ist erforderlich

Bei länger andauernden Beschwerden bzw. fehlender Besserung, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

a) Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Es liegen keine tierexperimentellen Studien zur Schwangerschaft und Stillzeit vor. Das potenzielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Posiformin® 2 % darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewandt werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich.

b) Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel beeinflusst auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch vorübergehend die Sehschärfe und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr, bei der Bedienung von Maschinen oder Arbeiten ohne sicheren Halt. Berufstätige Patienten und Kraftfahrer sollten Posiformin® 2 % deshalb bevorzugt zur Nacht anwenden.



**URSAPHARM**  
ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

### 2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

... Zu möglichen Wechselwirkungen liegen keine Untersuchungen vor.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hinweis:

Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen oder Augensalben anwenden, sollten Sie einen zeitlichen Abstand von 15 Minuten zwischen den Anwendungen der einzelnen Präparate einhalten. Augensalben sollten Sie stets als letztes anwenden.

### 3. Wie ist Posiformin® 2 % anzuwenden?

Wenden Sie Posiformin® 2 % immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### 3.1 Art der Anwendung

Zur Anwendung am Auge.

Augensalben sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tubenspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird. Schrauben Sie die Schutzkappe ab, legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid etwas vom Auge ab und bringen Sie durch leichten Druck auf die Tube einen kleinen Salbenstrang in den Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augenlider. Nach Gebrauch soll die Tube wieder sorgfältig verschlossen werden.

Verteilen Sie die Anwendung von Posiformin® 2 % gleichmäßig über den Tag.

Bei chronischen Reizzuständen des Auges sollte stets ein Augenarzt um Rat gefragt werden. Eine unkontrollierte Daueranwendung ist zu vermeiden.

#### 3.2 Soweit nicht anders verordnet, 3 bis 5 mal täglich einen ca. 0,5 cm langen Salbenstrang in den Bindehautsack einstreichen oder auf die erkrankten Stellen des Lides auftragen.

Posiformin® 2 % kann bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden.

Bei länger andauernden Beschwerden bzw. fehlender Besserung sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Posiformin® 2 % zu stark oder zu schwach ist.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Posiformin® 2 % Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig: Bei mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: Bei mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Bei mehr als 1 von 1.000 Behandelten	Selten: Bei mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: Bei 1 oder weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

Sehr selten ist eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Bibrocthalol (dem Wirkstoff von Posiformin® 2 %) oder Bestandteile der Salbengrundlage beobachtet worden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### 5. Wie ist Posiformin® 2 % aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und auf der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch nur 4 Wochen verwendbar.

Nicht über 25 °C lagern.

### Stand der Information:

August 2005

Bitte entnehmen Sie die Augensalbe durch sanftes Ausdrücken der Tube ohne Knicken und Aufrollen.