



Liebe Patientin!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Clotrimazol AL 200

Wirkstoff: Clotrimazol 200 mg pro Vaginaltablette

Zusammensetzung

1 Vaginaltablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

200 mg Clotrimazol

Sonstige Bestandteile:

Maisstärke, Lactose-Monohydrat, Polysorbat 80, Magnesiumstearat, Natriumhydrogencarbonat, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure, Adipinsäure

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 3 Vaginaltabletten mit Applikator (N1)

Stoff- oder Indikationsgruppe

Clotrimazol ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Breitspektrum-Antimykotika.

ALIUD® PHARMA GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen
Internet: www.aliud.de · E-Mail: info@aliud.de

Anwendungsgebiete

Ausfluss, bedingt durch Pilze (meist Candida); Entzündung der Scheide durch Pilze, Superinfektionen mit Clotrimazol-empfindlichen Bakterien.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Clotrimazol AL 200 nicht anwenden?

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Clotrimazol sollte aus Vorsicht nicht in der Frühschwangerschaft angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel werden von Clotrimazol AL 200 beeinflusst?

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Hinweis:

Während der Behandlung mit Clotrimazol AL kann es wegen der enthaltenen Hilfsstoffe bei gleichzeitiger Anwendung von Latexprodukten zu einer Verminderung von deren Funktionsfähigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit dieser Produkte kommen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Clotrimazol AL 200 nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Clotrimazol AL 200 sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Clotrimazol AL 200 und wie oft sollten Sie Clotrimazol AL 200 anwenden?

1-mal täglich wird abends an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 1 Vaginaltablette möglichst tief in die Scheide eingeführt.


Wie und wann sollten Sie Clotrimazol AL 200 anwenden?

Die Vaginaltabletten werden mit Hilfe des Applikators möglichst tief in die Scheide eingeführt. Dies geschieht am besten in Rückenlage bei leicht angezogenen Beinen.

Sollte auf Anweisung des Arztes eine Behandlung im 2. oder 3. Drittel der Schwangerschaft erforderlich sein, sollte diese ohne Applikator durchgeführt werden.

Die Behandlung sollte zweckmäßigerweise nicht während der Menstruation durchgeführt werden bzw. vor deren Beginn abgeschlossen sein.

Anwendung der Vaginaltablette mit einem Applikator



1. Der Kolben des Applikators wird bis zum Anschlag herausgezogen. Die Vaginaltablette wird aus dem Blisterstreifen entnommen und in den Applikator eingeschoben.



2. Legen Sie sich auf den Rücken und führen Sie vorsichtig den Applikator in die Scheide ein. Durch Druck auf den Kolben wird die Vaginaltablette freigegeben.



3. Der Applikator ist zum mehrmaligen Gebrauch bestimmt. Er muss daher nach jeder Anwendung sorgsam unter fließendem warmen (nicht kochendem) Wasser gereinigt werden. Der Kolben wird aus dem Applikator über den Anschlag hinaus herausgezogen, und beide Teile werden gesäubert. Mit einem sauberen Tuch trocknet man diese und setzt den Applikator wieder zusammen.

Anwendung der Vaginaltablette ohne Applikator



Die Vaginaltablette wird mit einem sauberen Finger vorsichtig möglichst tief in die Scheide eingeführt.

Wie lange sollten Sie Clotrimazol AL 200 anwenden?

Im Allgemeinen ist bei einer Scheidenentzündung, verursacht insbesondere durch Pilze, eine 3-Tage-Behandlung ausreichend. Falls erforderlich, kann eine zweite Behandlung über 3 Tage durchgeführt werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Clotrimazol AL 200 auftreten?

In seltenen Fällen können Hautreaktionen (z. B. Brennen, Stechen) vorkommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage ausführlich beschrieben sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bitte informieren Sie Ihren Arzt über aufgetretene Nebenwirkungen, damit er diese gegebenenfalls spezifisch behandeln kann.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und dem Blisterstreifen aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information

Juli 2003

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!