



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Clotrimazol AL 1 %

**Wirkstoff: Clotrimazol 0,01 g/g Creme**

### **Zusammensetzung**

1 g Creme enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

0,01 g Clotrimazol

Sonstige Bestandteile:

Benzylalkohol, Hexadecylpalmitat, Cetylstearylalkohol, (RS)-2-Octyldodecan-1-ol, Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser

### **Darreichungsform und Inhalt**

Originalpackung mit 20 g Creme (N1)

Originalpackung mit 50 g Creme (N2)

### **Stoff- oder Indikationsgruppe**

Clotrimazol ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Breitspektrum-Antimykotika (Mittel zur Behandlung von Pilzinfektionen).

**ALIUD® PHARMA GmbH & Co. KG**

**Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen**

**Internet: [www.aliud.de](http://www.aliud.de) · E-Mail: [info@aliud.de](mailto:info@aliud.de)**

### **Anwendungsgebiete**

Pilzinfektionen der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z.B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere, wie Malassezia furfur sowie Infektionen durch Corynebakterium minutissimum. Diese können sich äußern als Mykosen der Füße, Mykosen der Haut und der Hautfalten, Pityriasis versicolor, Erythrasma, oberflächliche Candidosen.

### **Gegenanzeigen**

#### **Wann dürfen Sie Clotrimazol AL 1 % nicht anwenden?**

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile.

Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol empfiehlt es sich, anstelle der Creme eine cetylstearylalkoholfreie Darreichungsform zu verwenden.

#### **Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Clotrimazol sollte aus Vorsicht nicht in der Frühschwangerschaft angewendet werden.

Um zu verhindern, dass geringe Wirkstoffmengen in die Muttermilch übergehen, darf Clotrimazol AL 1 % während der Stillzeit nicht im Brustbereich angewandt werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

#### **Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**

Bei der Anwendung von Clotrimazol AL 1 % müssen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

#### **Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

### **Welche anderen Arzneimittel werden von Clotrimazol AL 1 % beeinflusst?**

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).  
*Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.*

### **Welche Kosmetika sollten Sie meiden?**

Auf den erkrankten Hautstellen sollten Sie Deodorantien oder andere Kosmetika nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, da eine Minderung der Wirksamkeit von Clotrimazol AL 1 % nicht ausgeschlossen werden kann.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

*Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Clotrimazol AL 1 % nicht anders verordnet hat.*

*Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Clotrimazol AL 1 % sonst nicht richtig wirken kann!*

### **Wie viel von Clotrimazol AL 1 % und wie oft sollten Sie Clotrimazol AL 1 % anwenden?**

Die Creme wird 2- bis 3-mal täglich auf die erkrankten Stellen dünn aufgetragen und eingerieben. Es genügt meist eine kleine Menge Creme (ca. ½ cm Stranglänge) für eine etwa handtellergroße Fläche.

### **Wie sollten Sie Clotrimazol AL 1 % anwenden?**

Die Creme wird mit den Fingern dünn auf die erkrankten Hautpartien aufgetragen und dann in die Haut eingerieben.

### **Wie lange sollten Sie Clotrimazol AL 1 % anwenden?**

Wichtig für einen Erfolg der Behandlung ist die regelmäßige und ausreichend lange Anwendung der Creme. Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich; sie hängt unter anderem ab vom Ausmaß und der Lokalisierung der Erkrankung. Um eine komplette Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung mit der Creme nicht nach dem Abklingen der akuten entzündlichen Symptome oder subjektiven Beschwerden abgebrochen werden, sondern bis zu einer Behandlungsdauer von mindestens 4 Wochen fortgeführt werden.

Pityriasis versicolor heilt im Allgemeinen in 1 bis 3 Wochen und Erythrasma in 2 bis 4 Wochen ab. Bei Fußpilz sollte – um Rückfällen vorzubeugen – und trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen hinaus weiter behandelt werden. Nach jedem Waschen sollten die Füße gründlich abgetrocknet werden (Zehenzwischenräume).

## **Anwendungsfehler**

### **Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Anwendung von Clotrimazol AL 1 % vergessen haben?**

Nach einer vergessenen Anwendung wird die Behandlung mit der verordneten oder in der Dosierungsanleitung angegebenen Menge weitergeführt.

### **Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung für mehr als einen Tag unterbrechen oder vorzeitig beenden?**

Führen Sie die Behandlung in der gewohnten Weise fort. Versuchen Sie, die Behandlung konsequent durchzuhalten, da bei vorzeitigem Beendigung der Behandlungserfolg gefährdet ist.

## **Nebenwirkungen**

### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Clotrimazol AL 1 % auftreten?**

In seltenen Fällen können Hautreaktionen (z. B. Brennen, Stechen) vorkommen.

*Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage beschrieben sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.*

### **Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt über aufgetretene Nebenwirkungen, damit er diese gegebenenfalls spezifisch behandeln kann.

## **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt.

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

## **Stand der Information**

August 1999

## **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

