

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ADICLAIR® vorschriftsmäßig angewendet werden. Verwahren Sie diese Packungsbellege. Vielleicht möchten sie diese später nochmals lesen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet Informationen zu:

1. Was ist ADICLAIR® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ADICLAIR® beachten?
3. Wie ist ADICLAIR® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ADICLAIR® aufzubewahren?

Adiclair® Salbe

Wirkstoff: Nystatin



Zusammensetzung:

1 g Salbe enthält als

- arzneilich wirksamen Bestandteil:
100.000 I.E. Nystatin
- sonstige Bestandteile:
Dickflüssiges Paraffin, Zinkoxid, Polyethylen.

Darreichungsform und Inhalt:

ADICLAIR® ist in folgenden Packungen erhältlich:

- 20 g Salbe (N1)
- 50 g Salbe (N2)
- 100 g Salbe (N3)

1. Was ist ADICLAIR® und wofür wird es angewendet?

1.1 Wirkungsweise:

Das in ADICLAIR® enthaltene Nystatin wirkt spezifisch gegen Infektionserkrankungen mit Candida albicans und anderen Pilzen. Dabei wird Nystatin an die Zellmembranen gebunden, hemmt das Wachstum und zerstört die Pilzzellen.

1.2 von: Ardeypharm GmbH · Loerfeldstraße 20 · 58313 Herdecke · Telefon (023 30) 977 677

1.3 ADICLAIR® wird angewendet:

Zur Behandlung von Hautinfektionen mit nystatinempfindlichen Hefepilzen, insbesondere Behandlung von Mykosen im Windelbereich (mykotische Windeldermatitis).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ADICLAIR® beachten?

2.1 Wann darf ADICLAIR® nicht angewendet werden?

ADICLAIR® Salbe sollte nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates.

2.2 Wann ist bei der Anwendung von ADICLAIR® Vorsicht geboten?

Kinder:

Aufgrund der hohen Osmolarität von Nystatin wird von einer Anwendung bei sehr untergewichtigen und unreifen Frühgeborenen abgeraten.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Nystatin, der Wirkstoff in ADICLAIR®, wird in therapeutischer Dosis nach oraler Gabe über die intakte Haut oder über die Schleimhäute kaum resorbiert. Nystatin passiert die Plazentaschranke nicht, und ein Übertritt in die Muttermilch ist ebenfalls nicht zu erwarten.

ADICLAIR® kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:

Keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist ADICLAIR® anzuwenden?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt ADICLAIR® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschrift, da ADICLAIR® sonst nicht richtig wirken kann. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut.

ADICLAIR® auf die erkrankten Hautpartien auftragen.

3.2 Dosierung:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, sollten Sie ADICLAIR® folgendermaßen anwenden:

ADICLAIR® 2–3-mal täglich anwenden, in schweren Fällen auch häufiger.

3.3 Dauer der Anwendung:

Bei der Behandlung von Hefeinfektionen müssen sämtliche Infektionsherde auf der Haut und den Schleimhäuten vollständig beseitigt werden, um Rückfälle zu vermeiden.

Nach Abklingen der Erkrankung sollte die Anwendung zur Sicherheit des Behandlungserfolges weitere 8–10 Tage fortgesetzt werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von ADICLAIR® zu stark oder zu schwach ist.

3.4 Was ist zu tun, wenn Sie ADICLAIR® häufiger angewendet haben, als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal ADICLAIR® häufiger als vorgesehen angewendet haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Anwendung so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

3.5 Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig ADICLAIR® angewendet oder die Anwendung von ADICLAIR® einmal vergessen haben?

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, sondern setzen Sie die Anwendung so fort, wie es in dieser Packungsbeilage angegeben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch ADICLAIR® Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten: mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

4.1 Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von ADICLAIR® auftreten?

Das in ADICLAIR® enthaltene Nystatin wird bei äußerlicher Anwendung im allgemeinen gut vertragen. In seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen setzen Sie ADICLAIR® bitte ab, und sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist ADICLAIR® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Verfallsdatum dieser Packung ist außen auf dem Umkarton und auf dem Behältnis, welches die Salbe enthält, aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25 °C lagern. Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

Stand der Information: Januar 2005