

# Dermapharm AG



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker.

## Gebrauchsinformation

---

# Rivanol<sup>®</sup>-Lösung 0,1%

Wirkstoff: Ethacridinlactat-Monohydrat

---

### Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 ml Lösung enthält 1,05 mg Ethacridinlactat-Monohydrat

Sonstiger Bestandteil:

Gereinigtes Wasser

### Darreichungsform und Inhalt:

OP zu 100 ml, 300 ml, 500 ml und 1000 ml Lösung

### Desinfizienz/Antiseptikum

### Pharmazeutischer Unternehmer:

**Dermapharm AG**

Luise-Ullrich-Straße 6

82031 Grünwald

Tel.: 0 89/6 41 86-0

Fax: 0 89/6 41 86-130

### Hersteller:

**mibe** GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen  
der Dermapharm AG)

### Anwendungsgebiete:

Zur lokalen Anwendung als Antiseptikum

### Gegenanzeigen:

**Wann dürfen Sie Rivanol<sup>®</sup>-Lösung 0,1% nicht anwenden?**

Gegenanzeigen zur lokalen Anwendung von **Rivanol<sup>®</sup>-Lösung 0,1%** bestehen nicht.

### Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Durch Versuche mit Ethacridinlactat an Tieren konnte eine Entstehung von Mißbildungen nicht nachgewiesen werden. Keine Anwendung an der Brust während der Stillzeit.

## **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

### **Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

**Rivanol®-Lösung 0,1%** nicht mit anderen Lösungen mischen, da es sonst zu Ausflockungen kommen kann.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, sofern Ihnen Ihr Arzt **Rivanol®-Lösung 0,1%** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Rivanol®-Lösung 0,1%** sonst nicht richtig wirken kann. Soweit nicht anders verordnet, 2mal täglich **Rivanol®-Lösung 0,1%** örtlich für wenigstens 30 Minuten einwirken lassen.

### **Nebenwirkungen:**

### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Rivanol®-Lösung 0,1% auftreten?**

Selten kommt es zu Entzündungsreaktionen der Haut. In Einzelfällen ist das Auftreten von Schwellungen im Gesicht, Nesselsucht (Urtikaria), Kopfschmerzen und Krämpfen bekannt geworden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf der Flasche und der Faltschachtel aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Vor Licht geschützt lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

### **Stand der Information:**

Juni 2006

