

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

---

# Pan-Ophtal<sup>®</sup> Augentropfen

Wirkstoff: Dexpanthenol

DR. WINZER

---

### Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 ml Lösung enthält Dexpanthenol 50 mg.  
Sonstige Bestandteile: Cetrimid; Natriumedetat (Ph. Eur.); Hypromellose; Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph. Eur.); Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat; Wasser für Injektionszwecke.

### Darreichungsform und Inhalt

Packungen mit 10 ml und 3 x 10 ml Augentropfen  
Hornhautregenerativum

---

DR. WINZER PHARMA GMBH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin  
Telefon: 0 30/3 30 93-100  
Telefax: 0 30/3 30 93-305  
e-mail: medwiss@drwinzer.de

---

### Anwendungsgebiete

Zur symptomatischen Behandlung von Austrocknungserscheinungen der Horn- und Bindehaut infolge von Tränensekretionsstörungen aufgrund lokaler oder systemischer Grunderkrankungen sowie bei mangelndem Lidschluss.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Pan-Ophtal<sup>®</sup> Augentropfen nicht angewendet werden?*

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe dürfen Sie Pan-Ophtal<sup>®</sup> Augentropfen nicht anwenden.

*Was ist während der Schwangerschaft und Stillzeit zu berücksichtigen?*

Da nicht bekannt ist wie viel Dexpanthenol nach lokaler Applikation in den Blutkreislauf aufgenommen wird, sollte bei der Anwendung von Pan-Ophtal<sup>®</sup> Augentropfen während der Schwangerschaft und Stillzeit der Nutzen der Anwendung sorgfältig gegen ein mögliches Risiko abgewogen werden.

Sie sollten sowohl Ihrem Augenarzt als auch dem Internisten oder Hausarzt alle Medikamente, die Sie einnehmen oder lokal am Auge anwenden, nennen oder vorlegen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

*Was sollten Kontaktlinsenträger bei der Anwendung von Pan-Ophtal<sup>®</sup> Augentropfen beachten?*

Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung von Pan-Ophtal<sup>®</sup> Augentropfen aus dem Auge entfernt und erst nach 15 Minuten wieder eingesetzt werden.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Dieses Arzneimittel beeinflusst, auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, kurzfristig durch Schlierenbildung die Sehleistung und somit das

Reaktionsvermögen im Straßenverkehr, bei der Arbeit ohne sicheren Halt oder bei der Bedienung von Maschinen.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Pan-Ophtal® Augentropfen?*

Bisher keine bekannt.

*Hinweis:* Bei zusätzlicher Behandlung mit anderen Augentropfen/Augensalben soll zwischen den Anwendungen der unterschiedlichen Medikamente ein Abstand von mindestens 15 Minuten liegen.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

*Wie viel und wie oft sollten Sie Pan-Ophtal® Augentropfen anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, bei Bedarf mehrmals täglich einen Tropfen in den Bindehautsack tropfen.

*Wie sollten Sie Pan-Ophtal® Augentropfen anwenden?*

Nehmen Sie die geöffnete Tropfflasche in die Hand und ziehen Sie mit dem Zeigefinger der anderen Hand das Unterlid leicht nach unten. Bringen Sie bei zurückgeneigtem Kopf die Tropferspitze nahe über das Auge, ohne es zu berühren. Durch vorsichtigen Druck auf die Flasche einen Tropfen in den Bindehautsack tropfen.

*Wie lange sollten Sie Pan-Ophtal® Augentropfen anwenden?*

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

### **Überdosierung und andere Anwendungsfehler**

*Was ist zu tun, wenn Pan-Ophtal® Augentropfen in zu großen Mengen angewendet wurde (versehentliche oder beabsichtigte Überdosierung)?*

Die Überdosierung von Pan-Ophtal® Augentropfen ist mit keinen bekannten Risiken verbunden. Die therapeutische Wirkung wird nicht verbessert oder verschlechtert.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Pan-Ophtal® Augentropfen auftreten?*

Sehr selten kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen kommen.

*Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage genannt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.*

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden (siehe Faltschachtel und Etikett).

Nicht über + 25° C lagern!

Die Augentropfen dürfen nach Anbruch nicht länger als 4 Wochen verwendet werden.

### **Stand der Information**

Juni 2005

---

### **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6010636.00.01

---

**DR. WINZER PHARMA GMBH, 13581 Berlin**

---