


GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

Liebe Patientin,

bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker.

Mastodynon®

Mischung



Zusammensetzung:

10 g (10,8 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Agnus castus Ø 2,0 g; Caulophyllum thalictroides (HAB 34) Dil. D4 (HAB; Vorschrift 3a) 1,0 g; Cyclamen Dil. D4 1,0 g; Ignatia Dil. D6 1,0 g; Iris Dil. D2 2,0 g; Lilium tigrinum Dil. D3. 1,0 g.

Sonstige Bestandteile: 1,0 g Ethanol 15 Gew.-%, 1,0 g Ethanol 43 Gew.-%

Das Arzneimittel enthält 53 Vol.-% Alkohol.

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackungen mit 50 ml (N1), 100 ml (N2) und 200 ml [2 x 100 ml] (N3) Mischung.

Homöopathisches Arzneimittel für die Frauenheilkunde.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

BIONORICA AG

Kerschensteinerstr. 11 - 15, 92318 Neumarkt

Telefon: 0 91 81 / 2 31-90 · Telefax: 0 91 81 / 231-265

Internet: www.bionorica.de · E-Mail: info@bionorica.de

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

- Beschwerden vor der Periodenblutung, wie z.B. Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie)
- Beschwerden während der Periodenblutung und bei unregelmäßigen Periodenblutungen (Zyklusstörungen).

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder wiederkehrenden Beschwerden sollte ein/e Arzt/Ärztin aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen.

Hinweis: Mastodynon Mischung eignet sich nicht zur Behandlung von bösartigen Erkrankungen der Brust.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen Agnus castus und/oder Caulophyllum thalictroides und/oder Cyclamen und/oder Ignatia und/oder Iris und/oder Lilium tigrinum.

Hinweis: Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel nicht bei Alkoholkranken und bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit der/dem Ärztin/Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie beachten, wenn im Verlauf der Einnahme von Mastodynon Mischung eine Schwangerschaft eintritt oder Sie bereits schwanger sind?

Wenn im Verlauf der Einnahme von Mastodynon Mischung eine Schwangerschaft eintritt, ist eine Fortführung der Therapie nicht mehr sinnvoll, da aufgrund der Hormonumstellung Ihres Körpers die mit Mastodynon Mischung behandelbaren Symptome nicht mehr auftreten. Bitte setzen Sie das Arzneimittel ab.

Mastodynon Mischung sollte während der Schwangerschaft nicht eingenommen werden, da keine ausreichenden Erfahrungen hierzu vorliegen.

Was müssen Sie in der Stillzeit beachten?

Mastodynon Mischung sollte in der Stillzeit nicht angewendet werden, da keine ausreichenden Erfahrungen darüber vorliegen und im Tiermodell eine Verminderung der Milchproduktion beobachtet wurde.

Siehe auch unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise".

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Bei bestimmungsgemäßer Einnahme von Mastodynon Mischung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.



Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Tierexperimentell gibt es Hinweise auf eine dopaminerge Wirkung des in diesem Arzneimittel enthaltenen Wirkstoffes. Somit könnte eine wechselseitige Wirkungsabschwächung bei Gabe von Dopaminrezeptor-Antagonisten auftreten.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihre/n Ärztin/Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr/e Arzt/Ärztin Mastodynon Mischung nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Mastodynon Mischung sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Mastodynon Mischung und wie oft sollten Sie Mastodynon Mischung einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet: 2mal täglich 30 Tropfen.

Wie und wann sollten Sie Mastodynon Mischung einnehmen?

Jeweils morgens und abends mit etwas Wasser verdünnt einnehmen.

Mastodynon Mischung kann gegebenenfalls gleichzeitig mit anderen Flüssigkeiten eingenommen werden.

Flasche zur Entnahme senkrecht halten, s. Abbildung.



Wie lange sollten Sie Mastodynon Mischung anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein/e Arzt/Ärztin aufgesucht werden, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Behandlung bedarf.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Was ist zu tun, wenn Mastodynon Mischung in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein/e Arzt/Ärztin aufzusuchen ist. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes von 50 ml werden 20,9 g Alkohol, bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes von 100 ml werden 41,8 g Alkohol aufgenommen.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Mastodynon Mischung auftreten?

Gelegentlich können Übelkeit auch mit Brechreiz, Magenbeschwerden, leichte Gewichtszunahme, juckende Hautausschläge, Akne und Kopfschmerzen auftreten.

Bei Agnus castus haltigen pflanzlichen Arzneimitteln sind in Einzelfällen vorübergehende psychomotorische Unruhe, Verwirrheitszustände und Halluzinationen möglich.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihre/n Ärztin/Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrer/m Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel aus dieser Flasche nicht mehr nach diesem Datum!

Eine leichte Trübung oder Ausflockung kann bei längerer Lagerung auftreten. Sie beeinträchtigt die Wirkung des Präparates nicht. Aufgrund des Alkoholgehaltes sind angebrochene Flaschen gut haltbar. Aus Gründen der allgemeinen Arzneimittelsicherheit empfehlen wir jedoch, angebrochene Flaschen innerhalb von 12 Monaten aufzubrauchen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information:

März 2003

Diabetiker können Mastodynon Mischung unbedenklich einnehmen, da eine Einzeldosis dieses Arzneimittels weniger als 0,03 Broteinheiten (BE) enthält.

Das Arzneimittel ist auch in fester Form in Handel (Mastodynon Tabletten).

Mitvertrieb:

PLANTAMED Arzneimittel GmbH
Kerschensteinerstr. 11-15, 92318 Neumarkt
Telefon: 0 91 81 / 2 31-0 · Telefax: 0 91 81 / 2 18 50