

Liebe Patientin! Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Cimicifuga STADA®



Wirkstoff: Cimicifugawurzelstock-Trockenextrakt

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Filmtablette enthält 6,5 mg Trockenextrakt aus Cimicifugawurzelstock (4,5–8,5:1).

Auszugsmittel: Ethanol 60 %.

Sonstige Bestandteile:

Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph.Eur.), mikrokristalline Cellulose, Cellulosepulver, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Macrogol 4000, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Titandioxid (E171)

Hinweis für Diabetiker: 1 Filmtablette enthält 0,143 g Kohlenhydrate (Lactose-Monohydrat)

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 30 (N1), 60 (N2) und 100 (N3) Filmtabletten

Stoff- oder Indikationsgruppe: Pflanzliches Arzneimittel bei Wechseljahresbeschwerden

Pharmazeutischer Unternehmer:

STADA GmbH

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259

Internet: www.stada.de

Hersteller:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Anwendungsgebiete

Zur Besserung von psychischen und neurovegetativen Beschwerden, bedingt durch die Wechseljahre.

Hinweis: Bei Störungen bzw. Wiederauftreten der Regelblutung sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden anderen Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die der Abklärung durch einen Arzt bedürfen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Cimicifuga STADA® nicht anwenden?

Falls Sie wegen eines östrogenabhängigen Tumors in ärztlicher Behandlung sind oder waren, dürfen Sie Cimicifuga STADA® nicht anwenden, da nicht bekannt ist, ob Cimicifuga-Wurzelstockextrakte östrogenabhängige Tumore fördern oder unbeeinflusst lassen.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden ererbten Galaktose-Unverträglichkeit (Galaktoseintoleranz), einem erblich bedingten Laktasemangel oder einer Glukose-Galaktose-Malabsorption leiden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Cimicifuga STADA® soll wegen nicht ausrei-

Anforderungscoupon

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden Sie ihn an:

STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu Cimifuga STADA® interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

chender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Keine.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cimecifuga STADA® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cimecifuga STADA® sonst nicht richtig wirken kann!

In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Cimecifuga STADA® einnehmen?

Nehmen Sie 1-mal täglich 1 Filmtablette Cimecifuga STADA® ein.

Wie und wann sollten Sie Cimecifuga STADA® einnehmen?

Die Filmtabletten sollen mit ausreichend Flüssigkeit möglichst immer zur gleichen Tageszeit (morgens oder abends) eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Cimecifuga STADA® einnehmen?

Cimecifuga STADA® soll ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Monate eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Cimecifuga STADA® in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei Überdosierung von Cimecifuga STADA® können die unter „Nebenwirkungen“ genannten

Magenbeschwerden verstärkt auftreten. Das Arzneimittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cimecifuga STADA® auftreten?

Gelegentlich kann es zu Magenbeschwerden kommen; eine Gewichtszunahme ist möglich. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung aufgedruckt.

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Cimecifuga STADA® aufzubewahren?

Nicht über +25° C aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information:

1. Januar 2005

9206634
0502

586898

STADA

Name:

PLZ/Ort:

Vorname:

E-Mail:

Straße:

Geburtsdatum:

