

Liebe Patientin!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Agnus castus STADA® Filmtabletten



Wirkstoff: Keuschlammfrüchte-Trockenextrakt

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Filmtablette enthält 4 mg Trockenextrakt aus Keuschlammfrüchten (7 - 13 : 1).

Auszugsmittel: Ethanol 60 % (m/m)

Sonstige Bestandteile:

Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph.Eur.), mikrokristalline Cellulose, Glucosesirup, Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Macrogol 4000, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Titandioxid (E171), Eisen(III)-oxid (E172).

Hinweis für Diabetiker:

1 Filmtablette enthält 0,16 g Kohlenhydrate (Glucosesirup, Lactose-Monohydrat).

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 30 (N1), 60 (N2) und 100 (N3) Filmtabletten

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Agnus castus STADA® Filmtabletten ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Regelbeschwerden

Pharmazeutischer Unternehmer:

STADA GmbH

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259

Internet: www.stada.de

Hersteller:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Anwendungsgebiete

Rhythmusstörungen der Regelblutung (Regeltempoanomalien), Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten (Mastodynie), monatlich wiederkehrende Beschwerden vor Eintritt der Regelblutung (prämenstruelle Beschwerden).

Hinweis:

Bei Spannungs- und Schwellungsgefühl in den Brüsten sowie bei Störungen der Regelblutung sollte zunächst ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Untersuchung bedürfen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Agnus castus STADA® Filmtabletten nicht einnehmen?

Sie dürfen Agnus castus STADA® Filmtabletten nicht einnehmen, wenn Sie bereits auf dieses Arzneimittel oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich reagiert haben.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galaktose-Unverträglichkeit (Galaktoseintoleranz), einem erblich bedingten Laktasemangel oder Glukose-Galaktose-Malabsorption leiden.

Bei Hypophysentumoren (Geschwülste der Hirnanhangsdrüse) und Mammakarzinom (Brustkrebs) dürfen Sie Agnus castus STADA® Filmtabletten nicht einnehmen.

Anforderungscoupon

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden ihn an:

STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu Agnus castus STADA® Filmtabletten interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollten Agnus castus STADA® Filmtabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Agnus castus STADA® Filmtabletten?

Da es Hinweise auf eine dopaminerge Wirkung von Keuschlammfrüchten gibt, könnte eine wechselseitige Wirkungsabschwächung bei Gabe von Dopamin-Rezeptorantagonisten auftreten.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer

der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Agnus castus STADA® Filmtabletten nicht anders verordnet hat.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Agnus castus STADA® Filmtabletten sonst nicht richtig wirken kann!

In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Agnus castus STADA® Filmtabletten einnehmen?

Nehmen Sie 1-mal täglich 1 Filmtablette Agnus castus STADA® ein.

Wie und wann sollten Sie Agnus castus STADA® Filmtabletten einnehmen?

Agnus castus STADA® Filmtabletten soll möglichst immer zur gleichen Tageszeit eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Agnus castus STADA® Filmtabletten einnehmen?

Für eine zuverlässige Wirkung sollte Agnus castus STADA® Filmtabletten über mindestens 3 Monatszyklen eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Überdosierungen mit Agnus castus sind bisher nicht bekannt geworden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Agnus castus STADA® Filmtabletten eingenommen oder eine Anwendung vergessen haben?

Falls Sie einmal eine Einnahme vergessen haben, holen Sie diese Einnahme nicht nach, sondern fahren mit der nächsten Einnahme fort.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Agnus castus STADA® Filmtabletten auftreten?

Gelegentlich kann es zum Auftreten von juckenden Hautausschlägen kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Anzeichen von allergischen Hautausschlägen mit Bläschenbildung ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses:

Die Dauer der Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt 5 Monate.

Stand der Information:

15. November 2004

9211249 0411 V 18858

STADA



Name:

PLZ/Ort:

Vorname:

E-Mail:

Straße:

Geburtsdatum: